




ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Нормальна мікробіота тіла людини



У пацієнта **після тривалого вживання антибіотиків** розвинувся **дисбактеріоз кишечника**. Які препарати слід призначити для відновлення нормальної мікрофлори?

У пацієнта **після тривалого вживання антибіотиків** розвинувся **дисбактеріоз кишечника**. Які препарати слід призначити для відновлення нормальної мікрофлори?

Сульфаніламід

Інтерферон

Протигрибкові препарати

Еубіотики (пробіотики)

Нітрофуран

У пацієнта **після тривалого вживання антибіотиків** розвинувся **дисбактеріоз кишечника**. Які препарати слід призначити для відновлення нормальної мікрофлори?

Сульфаніламід

Інтерферон

Протигрибкові препарати

Еубіотики (пробіотики)

Нітрофуран



У хворого на **виразкову хворобу шлунка з підвищеною кислотністю** після ендоскопічного і бактеріологічного досліджень були **виділені бактерії роду Helicobacter**. Завдяки якій **властивості** ці мікроорганізми **НЕ** гинуть у кислому середовищі шлунка?

У хворого на **виразкову хворобу шлунка з підвищеною кислотністю** після ендоскопічного і бактеріологічного досліджень були **виділені бактерії роду Helicobacter**. Завдяки якій **властивості** ці мікроорганізми **НЕ гинуть** у кислому середовищі шлунка?

Уреазній активності

Каталазній активності

Оксидазній активності

Стійкості до ванкоміцину

Здібності утворювати капсулу

У хворого на **виразкову хворобу шлунка з підвищеною кислотністю** після ендоскопічного і бактеріологічного досліджень були **виділені бактерії роду Helicobacter**. Завдяки якій **властивості** ці мікроорганізми **НЕ гинуть** у кислому середовищі шлунка?

Уреазній активності

Каталазній активності

Оксидазній активності

Стійкості до ванкоміцину

Здібності утворювати капсулу



При **дисбактеріозах**, що супроводжуються **процесом гниття (протей, псевдомонада)** і **підвищенням рН фекалій**, необхідно призначати **біологічні препарати, що закисляють середовище і проявляють антагоністичну дію**. Які мікроорганізми до цього придатні?

При **дисбактеріозах**, що супроводжуються **процесом гниття (протей, псевдомонада)** і **підвищенням рН фекалій**, необхідно призначати **біологічні препарати, що закисляють середовище і проявляють антагоністичну дію**. Які мікроорганізми до цього придатні?

Клебсієли

Азотобактерії

Серація

Біфідумбактерії

Ентеробактер

При **дисбактеріозах**, що супроводжуються **процесом гниття (протей, псевдомонада)** і **підвищенням рН фекалій**, необхідно призначати **біологічні препарати, що закисляють середовище і проявляють антагоністичну дію**. Які мікроорганізми до цього придатні?

Клебсієли

Азотобактерії

Серація

Біфідумбактерії

Ентеробактер



У хворого 37 років в результаті **тривалої антибіотикотерапії** **розвинувся дисбактеріоз кишечника**. Який вид препаратів необхідно використати **для нормалізації кишкової мікрофлори**?

У хворого 37 років в результаті **тривалої антибіотикотерапії** **розвинувся дисбактеріоз кишечника**. Який вид препаратів необхідно використати **для нормалізації кишкової мікрофлори**?

Сульфаніламід

Бактеріофаг

Еубіотик

Аутовакцина

Вітамін

У хворого 37 років в результаті **тривалої антибіотикотерапії** **розвинувся дисбактеріоз кишечника**. Який вид препаратів необхідно використати **для нормалізації кишкової мікрофлори**?

Сульфаніламід

Бактеріофаг

Еубіотики

Аутовакцини

Вітаміни



Хворій, яка **довгий час приймала протимікробні засоби**, провели бактеріологічне дослідження вмісту піхви та визначення рН. Визначили **відсутність лактобактерій та лужне середовище**. Що слід призначити хворій **для відновлення нормальної мікрофлори піхви?**

Хворій, яка **довгий час приймала протимікробні засоби**, провели бактеріологічне дослідження вмісту піхви та визначення рН. Визначили **відсутність лактобактерій та лужне середовище**. Що слід призначити хворій **для відновлення нормальної мікрофлори піхви?**

Супозиторії з антибіотиками

Розчин перманганату калію

Сульфаніламідні препарати

Молочно-кислі бактерії

Супозиторії з антисептиком

Хворій, яка **довгий час приймала протимікробні засоби**, провели бактеріологічне дослідження вмісту піхви та визначення рН. Визначили **відсутність лактобактерій та лужне середовище**. Що слід призначити хворій **для відновлення нормальної мікрофлори піхви?**

Супозиторії з антибіотиками
Розчин перманганату калію
Сульфаніламідні препарати
Молочно-кислі бактерії
Супозиторії з антисептиком



У хворого 56 років після **тривалого лікування антибіотиками** **розвинувся дисбактеріоз:** втрата маси тіла, діарея, у фекаліях значна кількість **гемолітичних кишкових паличок, протей, стафілококів**. Які з перерахованих заходів дозволять **ліквідувати дисбаланс аутохтонної мікрофлори:**

У хворого 56 років після **тривалого лікування антибіотиками розвинувся дисбактеріоз**: втрата маси тіла, діарея, у фекаліях значна кількість **гемолітичних кишкових паличок, протей, стафілококів**. Які з перерахованих заходів дозволять **ліквідувати дисбаланс аутохтонної мікрофлори**:

Відмінити антибіотики і призначити еубіотики

Відмінити антибіотики і призначити сульфаніламідні препарати

Замінити антибіотики і провести фаготерапію

Давати ентеросорбенти та імуномодулятори

Давати нітрофуранові препарати та імуностимулятори

У хворого 56 років після **тривалого лікування антибіотиками** **розвинувся дисбактеріоз**: втрата маси тіла, діарея, у фекаліях значна кількість **гемолітичних кишкових паличок, протей, стафілококів**. Які з перерахованих заходів дозволять **ліквідувати дисбаланс аутохтонної мікрофлори**:

Відмінити антибіотики і призначити еубіотики

Відмінити антибіотики і призначити сульфаніламідні препарати

Замінити антибіотики і провести фаготерапію

Давати ентеросорбенти та імуномодулятори

Давати нітрофуранові препарати та імуностимулятори



У дитини 8 міс. спостерігається **дисфункція кишечника**. Якісний і кількісний аналіз кишкової мікрофлори дозволив діагностувати **дисбактеріоз**. Для лікування дитини **призначили колі-протейний бактеріофаг**. Який механізм дії цього препарату?

У дитини 8 міс. спостерігається **дисфункція кишечника**. Якісний і кількісний аналіз кишкової мікрофлори дозволив діагностувати **дисбактеріоз**. Для лікування дитини **призначили колі-протейний бактеріофаг**. Який механізм дії цього препарату?

Сприяє розмноженню біфідобактерій

Посилює антагоністичну активність лактобацил

Стимулює синтез секреторного IgA

Викликає лізис умовно-патогенних ентеробактерій

Підвищує бар'єрні властивості слизової оболонки кишечника

У дитини 8 міс. спостерігається **дисфункція кишечника**. Якісний і кількісний аналіз кишкової мікрофлори дозволив діагностувати **дисбактеріоз**. Для лікування дитини **призначили колі-протейний бактеріофаг**. Який механізм дії цього препарату?

Сприяє розмноженню біфідобактерій

Посилює антагоністичну активність лактобацил

Стимулює синтез секреторного IgA

Викликає лізис умовно-патогенних ентеробактерій

Підвищує бар'єрні властивості слизової оболонки кишечника

