




ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Вакцини та імунні сироватки.
Імунопатологія. Оцінка імунного статусу
організму



Працівникам клініки необхідно провести **вакцинацію проти гепатиту В**, створивши у **них штучний активний імунітет**. Який препарат слід застосувати з такою метою?

Працівникам клініки необхідно провести **вакцинацію проти гепатиту В**, створивши у **них штучний активний імунітет**. Який препарат слід застосувати з такою метою?

Гамма-глобулін з донорської крові

Специфічний імуноглобулін

Моноклональні антитіла

Рекомбінантну вакцину з вірусних антигенів

Інактивований вірус, що виріс у курячому ембріоні

Працівникам клініки необхідно провести **вакцинацію проти гепатиту В**, створивши у **них штучний активний імунітет**. Який препарат слід застосувати з такою метою?

Гамма-глобулін з донорської крові

Специфічний імуноглобулін

Моноклональні антитіла

Рекомбінантну вакцину з вірусних антигенів

Інактивований вірус, що виріс у курячому ембріоні



В пологовому будинку планується **вакцинація дітей проти туберкульозу**. Який із перелічених препаратів необхідно мати для цього?

В пологовому будинку планується **вакцинація дітей проти туберкульозу**. Який із перелічених препаратів необхідно мати для цього?

Вакцину БЦЖ

Вакцину АКДП

Туберкулін

Вакцину АДП

Вакцину СТІ

В пологовому будинку планується **вакцинація дітей проти туберкульозу**. Який із перелічених препаратів необхідно мати для цього?

Вакцину БЦЖ

Вакцину АКДП

Туберкулін

Вакцину АДП

Вакцину СТІ



В дитячому садку планується **проведення вакцинації проти коклюшу**. Який з наведених нижче препаратів необхідно використати з цією метою?

В дитячому садку планується **проведення вакцинації проти коклюшу**. Який з наведених нижче препаратів необхідно використати з цією метою?

Вакцина БЦЖ

Типоспецифічна сироватка

Нормальний гама-глобулін

Вакцина АКДП

АДП анатоксин

В дитячому садку планується **проведення вакцинації проти коклюшу**. Який з наведених нижче препаратів необхідно використати з цією метою?

Вакцина БЦЖ

Типоспецифічна сироватка

Нормальний гама-глобулін

Вакцина АКДП

АДП анатоксин



У відділення хірургічної стоматології надійшов **пацієнт з відкритим переломом нижньої щелепи**. Який препарат слід застосувати з метою **активної імунізації проти правцю?**

У відділення хірургічної стоматології надійшов **пацієнт з відкритим переломом нижньої щелепи**. Який препарат слід застосувати з метою **активної імунізації проти правцю?**

Протирправцевий імуноглобулін

Протиправцеву сироватку

Коклюшно-дифтерійну-правцеву вакцину

Гама-глобулін з крові донорів, імунізованих проти правцю

Правцевий анатоксин

У відділення хірургічної стоматології надійшов **пацієнт з відкритим переломом нижньої щелепи**. Який препарат слід застосувати з метою **активної імунізації проти правцю?**

Протирправцевий імуноглобулін

Протиправцеву сироватку

Коклюшно-дифтерійну-правцеву вакцину

Гама-глобулін з крові донорів, імунізованих проти правцю

Правцевий анатоксин



Для вакцинації використовують **токсин, знешкоджений формальдегідом (0,4%) при 37- 40° С протягом чотирьох тижнів**. Вперше такий препарат застосував **для профілактики дифтерії** Рамон. Що це за препарат?

Для вакцинації використовують **токсин, знешкоджений формальдегідом (0,4%) при 37- 40° С протягом чотирьох тижнів**. Вперше такий препарат застосував **для профілактики дифтерії** Рамон. Що це за препарат?

Імуноглобулін

Антитоксична сироватка

Анатоксин

Ад'ювант

Вбита вакцина

Для вакцинації використовують **токсин, знешкоджений формальдегідом (0,4%) при 37- 40° С протягом чотирьох тижнів**. Вперше такий препарат застосував **для профілактики дифтерії** Рамон. Що це за препарат?

Імуноглобулін

Антитоксична сироватка

Анатоксин

Ад'ювант

Вбита вакцина



З метою **специфічної профілактики** використана вакцина, яка **містить в своєму складі мікроорганізми і знешкоджений формаліном екзотоксин**. До яких вакцин вона належить?

З метою **специфічної профілактики** використана вакцина, яка **містить в своєму складі мікроорганізми і знешкоджений формаліном екзотоксин**. До яких вакцин вона належить?

Асоційованих
Генно-інженерних
Анатоксинів
Хімічних
Живих

З метою **специфічної профілактики** використана вакцина, яка **містить в своєму складі мікроорганізми і знешкоджений формаліном екзотоксин**. До яких вакцин вона належить?

Асоційованих

Генно-інженерних

Анатоксинів

Хімічних

Живих



Стоматологи належать до групи підвищеного ризику щодо можливості **професійного зараження гепатитом В**. Виберіть препарат, який слід використати для надійної активної профілактики цієї хвороби:

Стоматологи належать до групи підвищеного ризику щодо можливості **професійного зараження гепатитом В**. Виберіть препарат, який слід використати для надійної активної профілактики цієї хвороби:

Жива вакцина проти гепатиту В

Специфічний імуноглобулін

Протигепатина сироватка

Рекомбінантна вакцина з білків HBs Ag

Моноклональні антитіла проти HBs Ag

Стоматологи належать до групи підвищеного ризику щодо можливості **професійного зараження гепатитом В**. Виберіть препарат, який слід використати для надійної активної профілактики цієї хвороби:

Жива вакцина проти гепатиту В

Специфічний імуноглобулін

Протигепатина сироватка

Рекомбінантна вакцина з білків HBs Ag

Моноклональні антитіла проти HBs Ag



Для **попередження сезонного підйому захворюваності на грип** у лікувальних закладах міста санепідстанція зобов'язала провести імунізацію медпрацівників. Яким із перелічених препаратів слід проводити імунізацію?

Для **попередження сезонного підйому захворюваності на грип** у лікувальних закладах міста санепідстанція зобов'язала провести імунізацію медпрацівників. Яким із перелічених препаратів слід проводити імунізацію?

Амантадин

Ремантадин

Гамма-глобулін

Субодинична вакцина

Інтерферон

Для **попередження сезонного підйому захворюваності на грип** у лікувальних закладах міста санепідстанція зобов'язала провести імунізацію медпрацівників. Яким із перелічених препаратів слід проводити імунізацію?

Амантадин

Ремантадин

Гамма-глобулін

Субодинична вакцина

Інтерферон



Дитині віком 6-ти років, у якої **запідозрено активний туберкульозний процес**, проведено **діагностичну реакцію Манту**. Який імунобіологічний препарат при цьому було введено?

Дитині віком 6-ти років, у якої **запідозрено активний туберкульозний процес**, проведено **діагностичну реакцію Манту**. Який імунобіологічний препарат при цьому було введено?

Вакцина БЦЖ

Вакцина АДП

Тулярін

Туберкулін

Вакцина АКДП

Дитині віком 6-ти років, у якої **запідозрено активний туберкульозний процес**, проведено **діагностичну реакцію Манту**. Який імунобіологічний препарат при цьому було введено?

Вакцина БЦЖ

Вакцина АДП

Тулярін

Туберкулін

Вакцина АКДП



Вкажіть, які **профілактичні препарати** слід ввести хворому з **відкритою щелепно-лицевою травмою**, якщо він раніше ніколи не одержував профілактичних щеплень?

Вкажіть, які **профілактичні препарати** слід ввести хворому з **відкритою щелепно-лицевою травмою**, якщо він раніше ніколи не одержував профілактичних щеплень?

Протиправцевий імуноглобулін і анатоксин

Протисудомні препарати та анатоксин

Протиправцеву сироватку та антибіотики

Вакцину АКДП та антибіотики

Правцевий анатоксин і антибіотики

Вкажіть, які **профілактичні препарати** слід ввести хворому з **відкритою щелепно-лицевою травмою**, якщо він раніше ніколи не одержував профілактичних щеплень?

Противправцевий імуноглобулін і анатоксин

Протисудомні препарати та анатоксин

Противправцеву сироватку та антибіотики

Вакцину АКДП та антибіотики

Правцевий анатоксин і антибіотики

